



การรักษาซีสฟิลิส มีวิธีการอย่างไร?

- ผู้ป่วยโรคซีสฟิลิสระยะที่ 1, 2 และระยะแฝง
ช่วงต้น (Early latent syphilis) แนะนำ
ให้ ฉีดยาเบนซาทีน
เบนซอิลเพนซิลลินจี (Benzathine penicillin G)
2.4 ล้านยูนิตต่อ 1 ครั้ง
แบ่งฉีดเข้ากล้ามเนื้อสะโพกข้างละ 1.2 ล้านยูนิต
- ผู้ป่วยโรคซีสฟิลิสระยะแฝงช่วงปลาย
(Late latent syphilis) หรือผู้ป่วยซีสฟิลิสที่ไม่ทราบ
ระยะเวลาในการติด (Unknown duration of
syphilis)
ฉีดยาเบนซาทีน เบนซอิลเพนซิลลินจี (Benzathine
penicillin G) 2.4 ล้านยูนิต 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 3 ครั้ง
ครั้งละ 1 สัปดาห์ แบ่งฉีดเข้ากล้ามเนื้อสะโพก
ข้างละ 1.2 ล้านยูนิต

การป้องกันตัวจากการติด เชื้อซีสฟิลิส



- ใส่ถุงยางอนามัยป้องกันทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
- หากคู่นอนมีแผลซีสฟิลิสบริเวณปาก, อวัยวะเพศ,
หรือทวารหนัก ให้งดการมีเพศสัมพันธ์
- ผู้ที่มีการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยโรคซีสฟิลิสจะพบว่า
ผู้ป่วยจะหาย
- ควรตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



ซิฟิลิส (SYPHILIS)

เทศบาลตำบลโคกพุทรา



ซิฟิลิส (Syphilis)

ซิฟิลิส (Syphilis) คือ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ผ่าน
การสัมผัสกับสารคัดหลั่งที่ทำให้เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียทรีโปเนมา พัลลิดัม (Treponema pallidum) สาเหตุที่ทำให้เกิด
เป็นแผล ซิฟิลิส หรือแผลริมเนื้อ (Chancres) ขึ้นเป็นตุ่ม
นูนแดงออก เป็นแผลกว้างที่ปาก อวัยวะเพศ หรือทวารหนัก
โรคซิฟิลิสที่ไม่ได้รับการรักษาให้หายตั้งแต่ระยะเป็นแผล
จะพัฒนาไปสู่ระยะออกดอก และระยะติดเชื้อที่ทั่วร่างกาย
ประสาท ระบบ หลอดเลือดและหัวใจ และทำให้เสียชีวิตได้
ในที่สุด ควรรับ พบแพทย์เพื่อรับการรักษา

ซิฟิลิส (Syphilis) มีสาเหตุจากอะไร?

มีสาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรียทรีโปเนมา พัลลิดัม
(Treponema pallidum) ผ่านการสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่ง
ของผู้ติดเชื้อ เช่น การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่สวมถุงยางอนามัย
การกissingปากหรือการทำออรัลเซ็กส์ (Oral sex) การจูบที่
สัมผัสกับน้ำลาย การสัมผัสกับบาดแผลหรือเยื่อเมือกของ
ผู้ที่ติดเชื้อ หรือการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกขณะ
ตั้งครรภ์ หรือระหว่างการคลอดบุตร



ซิฟิลิส มีอาการที่ ระยะ?

ซิฟิลิสระยะที่ 1 ระยะปฐมภูมิ หรือระยะเป็นแผล (Primary syphilis)

อาการของซิฟิลิสในระยะที่ 1
หรือระยะเป็นแผลจะปรากฏเป็นแผลแผลเล็ก ๆ สีแดง
ขอบนูนแข็งที่บริเวณอวัยวะเพศ
ปาก ทวารหนัก ทอปัสสาวะ เยื่อหูตา หรือเยื่อหูของคอ
ภายใน 3 สัปดาห์หลังติดเชื้อ

ซิฟิลิสระยะที่ 2 ระยะทุติยภูมิ หรือระยะออกดอก (Secondary syphilis)

อาการของซิฟิลิสในระยะที่ 2
หรือระยะออกดอกจะปรากฏอาการ 3-12 สัปดาห์
หลังติดเชื้อ เป็นระยะที่เชื้อซิฟิลิสแพร่กระจายไป
ตามน้ำเหลืองและกระแสเลือดตามอวัยวะต่าง ๆ
ที่ร่างกายรวมกับการตอบสนองของเชื้อ มีไข้ เจ็บคอ
แขนขาชา น้ำหนักลด ปวดข้อ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เชื้อโรค
ในปาก ผื่นรอบตัวศีรษะหรือรอบเป็นหลุม ๆ ในระยะนี้
หากตรวจเจอเลือด
มีภูมิคุ้มกันเป็นบวก



ซิฟิลิส มีอาการที่ ระยะ? (ต่อ)

ซิฟิลิสระยะที่ 3 ระยะแฝง (Latent syphilis)

ผู้ที่ไม่ได้รับการรักษาโรคซิฟิลิสใน 2 ระยะแรก
จะพัฒนาไปสู่ซิฟิลิสในระยะที่ 3 หรือระยะแฝง
เป็น "ระยะสงบทางคลินิก" ที่แทบจะไม่แสดงอาการ
อะไร เป็นระยะที่มีภูมิต้านทานโรคยาวนานที่สุด
โดยเชื้อสามารถแฝงอยู่ในร่างกายได้นานกว่า 20 ปี
ก่อนที่เชื้อจะพัฒนาไปสู่ระยะที่ 4 หรือซิฟิลิสระยะสุดท้าย
ผู้ที่เข้าสู่ซิฟิลิสระยะนี้อาจมีผื่น หรือแผลออกดอก
ที่ร่างกายแบบเป็น ๆ หาย ๆ และสามารถ
แพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่นได้ผ่านการมีเพศสัมพันธ์
การสัมผัสกับสารคัดหลั่งหรือเยื่อเมือก หรือการแพร่
เชื้อจากการถ่ายทอดทางกระดูกหรืออวัยวะ
การคลอดบุตร

ซิฟิลิสระยะที่ 4 ระยะสุดท้าย (Tertiary syphilis)

ผู้ติดเชื้อซิฟิลิสราว 15-30% ที่ไม่ได้รับการรักษาอย่าง
เหมาะสมจะมีการดำเนินโรคเข้าสู่ซิฟิลิสระยะที่ 4 หรือ
ระยะสุดท้าย โดยจะพบรอบโรคเป็นแผล ฝีมุข
นูนตามร่างกายไม่เจ็บที่ผิวหนังหรือเยื่อเมือก เป็นระยะที่
เชื้อซิฟิลิสในต่อมน้ำเหลืองและกระแสเลือดทำลายอวัยวะ
ภายในให้ได้รับความเสียหายทำให้เกิดโรคและความผิดปกติ
ต่าง ๆ เช่น ความผิดปกติในการเคลื่อนไหว
สิ้นหัวใจหรือ หลอดเลือดแดงใหญ่อักเสบ การเสื่อมของสมอง
ตาบอด หูหนวก อัมพาต ชัก และอาจนำไปสู่การเสียชีวิต
ในที่สุด